HÉTÉROCÈRES NOUVEAUX DE L'AMÉRIQUE DU SUD

par **Paul Dognin.**

EPIPLEMIDÆ.

Crypsicoela n. gen.

Antennes épaisses, à peine pubescentes; palpes droits dépassant peu le front. Supérieures avec l'apex obtus, le bord terminal fortement denté sur 6 et 7, très légèrement sur 4, échancré entre les deux, puis droit jusqu'à l'angle interne qui se recourbe en une dent intérieure, le bord interne fortement échancré sitôt après et jusque vers le premier tiers. La 5 quittant la cellule à l'angle supérieur; 6 et 7 tigées; 8 et 9 tigées; 10 partant de la cellule. Inférieures avec la côte échancrée au troisième quart et poilue sauf sur l'échancrure, l'apex carré, le bord terminal fortement denté sur 7, un peu moins sur 6, un peu moins encore sur 4; la nervure 3 quittant la cellule avant l'angle, 4 de l'angle, 5 du milieu de la discocellulaire, 6 et 7 de l'angle supérieur; fovea à la base de l'aile qui n'a ni gouttière ni pli abdominal.

Type : *Crypsicoela subocellata* Dgn.

Crypsicoela subocellata n. sp. — 32 mill. — Dessus des quatre ailes brun avec quelques fines stries noires; les supérieures avec une éclaircie roussâtre au milieu de la côte, celle-ci coupée au premier tiers par une ligne brun sombre, semi-longitudinale, droite et s'arrêtant sur le pli vers l'extrémité de la cellule et deux lignes transversales de taches intranervurales en forme de chapelets, savoir : un premier chapelet (médian) dont deux taches marquées de brun sombre sur le bord interne sont seules bien indiquées, un second chapelet, extracellulaire, de taches ogivales, teintées de marron, quatre d'entre elles lisérées de blanc extérieurement (celles entre 1 et 2, 4 et 5, 5 et 6, 7 et 8), enfin, une barre brun sombre, droite, allant de l'apex à la 3 sur le bord terminal. Inférieures avec une série extrabasilaire, arrondie, de six gros points brun sombre et un chapelet extracellulaire de taches ogivales comme aux supérieures, la plupart des taches lisérées d'un peu de blanc. Franges couleur du fond. Dessous des ailes gris brunâtre, la côte des supérieures fauve striée de noir, les quatre ailes avec un assez gros point cellulaire fauve. Tête et corps couleur du fond, le collier plus pâle.

Popayan, Colombie; un ♂.

Asyngria n. gen.

Antennes assez épaisses, finement pubescentes; palpes assez gros, droits, dépassant bien le front, à troisième article court. Supérieures avec l'apex acuminé, le bord terminal bien arrondi; inférieures avec le bord terminal très faiblement proéminent sur 7, puis droit jusqu'à 4 où il s'arrondit légèrement. Aux premières ailes la nervure 3 quittant la cellule avant l'angle, 4 de l'angle, 5 immédiatement du dessous de l'angle supérieur; 6 et 7 tigées; 8 et 9 tigées ensemble puis avec 10 qui s'anastomose sur un point avec 11 pour former une petite cellule supplémentaire oblongue; 12 libre. Inférieures avec la 3 quittant la cellule peu avant l'angle, 4 de l'angle, 5 du milieu de la discocellulaire, 6 et 7 tigées.

Type : *Asyngria nigripuncta* Dgn.

Ce genre est voisin d'*Hemioplisis* H. Sch. (*Decetiodes* Warr.).

Asyngria nigripuncta n. sp. — 27 mill. — Dessus des quatre ailes gris souris strié de brun; les supérieures traversées au troisième quart par une ligne pâle, bien délimitée, à peu près parallèle au bord terminal, mais émettant un coude profond, extérieur, entre 3 et 5 et trois taches subapicales noires, les deux premières rondes entre 5 et 7, la troisième allongée, la pointe vers l'apex. Inférieures avec une ligne faisant suite à celle des premières ailes, également coudée entre 3 et 5. Franges concolores. Dessous des quatre ailes gris strié de brun.

El Monje près Lojà, Équateur; un ♂.

Epiplema raripuncta n. sp. — 20 mill. — Bord terminal des supérieures droit, des inférieures très légèrement denté sur 4 et 7, l'espace entre ces deux dents très peu échancré. Les quatre ailes blanches avec quelques taches formées de stries agglomérées d'un roux brun, savoir : trois petites taches antémédiales entre le bord interne et la 1, la 1 et la 2 et à l'extrémité de la cellule, quatre taches un peu plus grandes sur l'emplacement de l'extracellulaire entre le bord interne et la 1, la 1 et la 2, la 4 et la 5, la 7 et la 8; quelques traits subterminaux dans la moitié supérieure du bord terminal; la côte coupée de quelques stries. Inférieures avec l'indication d'une tache cellulaire, d'une tache costale, l'emplacement de l'extracellulaire et quelques traits subterminaux. Dessous blanc, sans dessins. Franges, tête, corps et pattes blancs.

Loja, Équateur; une ♀.

Epiplema lignicolor n. sp. — 20 mill. — Supérieures avec le bord terminal renflé sur 3 et 4, bien denté sur 6 et 7, échancré sur

la 5 et le bord interne légèrement échancré dans la seconde moitié. Bord terminal des inférieures denté sur 4 et 7 avec une échancrure entre les deux. Dessus des ailes couleur bois tirant sur le fauve, les dessins, d'ailleurs peu nets, marqués en brun foncé ; ils se composent d'une tache terminale aux supérieures entre 4 et 6 et d'une large bande médiane commune, plus ou moins incomplète aux premières ailes et émettant une dent extérieure sur la 4 aux secondes ailes qui ont le bord terminal plus ou moins rembruni. Une touffe de poils à l'angle interne des supérieures. Dessous plus clair, les inférieures sans dessin, les supérieures avec un rappel indistinct de bande médiane.

Micay, Colombie ; deux ♂.

Epiplema obliquifascia n. sp. — 20 mill. — Ailes découpées comme dans l'espèce précédente, couleur noisette avec quelques stries brunes, les dessins bruns. L'échancrure des supérieures entre 4 et 6 bordée de brun, les quatre ailes traversées par une large bande commune dont les deux lignes extérieures s'écartent davantage à la côte des premières ailes, l'intérieur se fonce aux secondes ailes et qui contient, aux supérieures, une ligne épaisse, sombre, droite, coupant obliquement l'aile, à peu près parallèlement au bord terminal. Un point terminal brun aux inférieures qui sont finement lisérées de blond ; franges brunes et blondes. Dessous blond avec quelques stries plus foncées. Tête et corps concolores.

Micay, Colombie ; une ♀.

Rappelle en plus petit *Epiplema rufula* Warr., s'en distingue par la ligne oblique des supérieures.

GEOMETRIDÆ.

Miantonota punctilinea n. sp. — 34 mill. — Dessus des ailes vert pâle uniforme, chaque aile avec un point cellulaire brun, beaucoup plus gros aux supérieures. Les quatre ailes traversées par deux lignes de points nervuraux blancs ; la première ligne extrabasilaire, chaque point blanc suivi extérieurement de quelques écailles noires ou vert sombre sur la nervure, la seconde ligne subterminale, les points sur 1, 2 et 5 plus éloignés du bord et chaque point précédé intérieurement d'un autre point également nervural ou noir ou vert plus sombre. Franges vert pâle à extrémité blanchâtre. Dessous des quatre ailes ainsi que leurs franges d'un vert plus pâle, les inférieures devenant presque blanches. Front brun ; vertex (entre les antennes) vert ; antennes brunes marquées d'un point blanc à leur base ; collier blanc ; ptérygodes et thorax verts ; dessus de l'abdomen décoloré (a dû être vert) ; dessous du corps et pattes blanc verdâtre.

Mérida, Venezuela ; un ♂.

Heterusia rubrimarmorata n. sp. — 22 mill. — Dessus des quatre ailes noir; les supérieures avec la côte coupée par trois taches blanches et une bande blanche, droite, assez étroite, traversant l'aile du bord interne (vers son milieu) pour s'arrêter au coin de la cellule en dessous de la 3. Les inférieures entièrement traversées par cette même bande, plus large et coudée extérieurement en dessus de la 4, contenant en outre un gros point cellulaire noir. Franges noires coupées de quelques poils blancs. Dessous des ailes comme le dessus, mais les supérieures avec la côte et l'apex largement ferrugineux, la côte striée de blanc en outre des taches et la ligne blanche s'élargissant vers le bord interne; les inférieures avec le premier tiers et la bordure terminale envahis de ferrugineux et d'écailles blanches et jaunes. Les franges noires coupées de blanc. Dessus du corps noir, l'abdomen finement cerclé de quelques poils blancs; dessus du corps blanchâtre; pattes blanches coupées de brun.

Micay, Colombie; un ♂.

Se place auprès de *funebris* Warr.

Eudule semirubra n. sp. — 17 mill. — Tête, corps, pattes et dessus des supérieures brun marron, ces dernières semées de quelques rares écailles jaunes le long de la côte et du bord terminal. Dessus des inférieures rouge brique pâle, les franges brun marron. Dessous des quatre ailes rouge brique pâle, les premières ailes avec une bordure brun marron le long de la côte, plus large à l'apex et continuant le long du bord terminal en s'amincissant au point de ne pas atteindre toujours l'angle interne; les secondes ailes avec une large bordure terminale brun marron. Ces bordures sont semées d'écailles rouge brique et varient suivant les individus en se fondant plus ou moins dans la couleur du fond.

Loja, Équateur; trois ♂.

Prochoerodes fleximargo n. sp. — 40 mill. — Supérieures avec l'apex obtus, le bord terminal ni droit ni anguleux, mais très légèrement échancré sur la 7 et très légèrement renflé de 4 à 6; bord terminal des inférieures légèrement denté sur 4. Dessus des quatre ailes gris noisette coupé transversalement par une fine ligne commune, droite, géminée, noire, à centre blanchâtre, partant du milieu du bord abdominal pour aboutir à la côte bien avant l'apex; chaque aile avec une ombre subterminale partielle fortement zigzaguée, aboutissant aux angles interne et anal, les supérieures avec un très petit point cellulaire noir. Franges concolores. Dessous d'un gris plus terne finement saupoudré de petits atomes noirs, sans dessin apparent, sauf quatre petits points cellulaires peu marqués. Tête et corps concolores.

Venezuela; un ♂.

Se place à côté de *Prochoerodes cristata* Warr. dont la ligne aboutit également à la côte avant l'apex et sans former d'angle.

Dectochilus marginata n. sp. — 36 mill. — Dessus des supérieures fauve saupoudré de quelques atomes bruns, les dessins brun lilacé. Ils se composent d'une assez large ligne traversant l'aile au premier tiers, coudée dans la cellule, puis droite jusqu'au bord interne, d'un point cellulaire, puis d'une très large bande envahissant tout le dernier quart de l'aile, un peu plus large au bord interne que sur la côte, la distance entre les deux lignes doublement plus grande à la côte qu'au bord interne. Dessus des inférieures blanc grisâtre avec un tout petit point cellulaire et une large bande terminale noirâtre très pâle. Franges couleur des bandes terminales. Dessous des quatre ailes fauve très pâle semé de quelques atomes avec le rappel des points cellulaires et des bandes terminales.

Araucanie; un ♂.

Anisoperas proxima n. sp. — 32 mill. — Bords terminaux des quatre ailes bien coudés sur la 4. Dessus gris brun, les supérieures avec un petit point cellulaire et traversées par quatre fines lignes plus sombres, savoir : une extrabasilaire coudée à la côte puis droite, une médiane plus perpendiculaire, une extracellulaire droite, passant extérieurement à un gros point subcostal blanc allongé pour aboutir à la côte peu avant l'apex, enfin une subterminale plus sombre, coudée extérieurement sur la 5, l'espace médian entre la seconde et la troisième ligne un peu roussâtre. Les inférieures avec une extracellulaire à peu près droite faisant suite à celle des supérieures, l'espace en avant roussâtre jusqu'au point cellulaire et une subterminale arrondie. La ligne subterminale accompagnée aux quatre ailes de petits points nervuraux blancs, mieux indiqués aux inférieures. Franges concolores. Dessous des quatre ailes gris avec une ombre subterminale, un rappel indistinct de l'extracellulaire aux supérieures, l'apex des premières ailes et les bords terminaux tachés de blanchâtre.

Lojà, Équateur; un ♂.

Cette espèce a les lignes d'*Anisoperas rectilinea* Warr. et le point blanc d'*atropunctaria* Wlk.; les bords terminaux sont plus coudés que dans *rectilinea*.

Eusarca maculifascia n. sp. — 35 mill. — Bord terminal bien coudé sur la 4 aux premières ailes, plus légèrement aux inférieures. Dessus des quatre ailes jaune paille avec quelques fines stries violacées, traversé par une ligne commune d'un jaune plus sombre, à peu près droite, partant du bord abdominal un peu après le milieu pour s'arrêter sans l'atteindre vers la côte des supérieures

peu avant l'apex; cette ligne est suivie aux premières ailes d'une série extérieure de taches violacé pâle accolées contre elle, la plus grande entre 1 et 2, aux inférieures elle est suivie d'une série subterminale de taches également violacé pâle, mais qui en sont bien complètement isolées. Chaque aile avec un petit point cellulaire, les supérieures traversées en outre par une ligne extrabasilaire violacé pâle, coudée au milieu. Dessous pareil. Franges concolores. Tête, thorax et pattes couleur du fond.

Paraguay; une ♀.

Pyrinia dispansa n. sp. — 23 mill. — Dessus des ailes ocre, traversé par une assez large ligne commune brun jaune, partant du second tiers du bord abdominal, à peu près droite aux inférieures, coupant le bord interne des supérieures également au second tiers, puis droite pour s'infléchir légèrement et atteindre l'apex immédiatement en dessous; les supérieures avec une seconde ligne de même nuance, extrabasilaire, coudée dans la cellule, quelques fines stries brunes et un point brun jaune subapical sur la côte. Franges brun jaune. Dessous des ailes d'un jaune ocre vif semé de petites stries brun ferrugineux espacées, les lignes et la frange comme en dessus, mais d'une teinte plus vive, brun ferrugineux, les supérieures avec une bordure terminale partielle également brun ferrugineux. Tête, corps et pattes teinte ocre.

Santa-Cruz, Brésil méridional; une ♀.

Cette espèce ressemble beaucoup à *Pyrinia copiosata* Gn., mais dans celle-ci la ligne commune aboutit à la côte des supérieures avant l'apex et non immédiatement au-dessous de celui-ci.

Microsema attenuata n. sp. — 24 mill. — Bord terminal des supérieures renflé à la 4, des inférieures bien denté également sur la 4. Dessus des quatre ailes paille pâle, strié de brun jaune, chaque aile avec un tout petit point cellulaire noir et une fine ligne commune, géminée, brun jaune, coupant en ligne droite les inférieures au delà du point, oblique aux supérieures qu'elle traverse du milieu du bord interne à l'apex. Les premières ailes avec une ligne extrabasilaire, arquée, les inférieures avec une fine ligne transversale médiane contournant le point intérieurement, les quatre ailes avec des stries accumulées dans l'espace subterminal et terminal. Dessous paille, les stries brunes plus clairsemées qu'en dessus, les points cellulaires noirs plus gros; supérieures avec une ligne extracellulaire arrondie, accompagnée d'une ombre noire de la 3 à la côte, inférieures avec une série extracellulaire de points nervuraux noirs. Franges, tête, corps et pattes teinte paille.

Loja, Équateur; une ♀.

Acrotomodes cretinotata n. sp. — 32 mill. — Dessus des quatre ailes brun jaunâtre, traversé par une très large bande centrale commune couleur du fond et dont les deux bords sont à peine indiqués par deux fines lignes plus sombres, la première peu avant le centre, assez droite et à peu près parallèle au bord terminal des deux ailes, mais coudée à la côte des supérieures, la seconde ligne également coudée au départ des supérieures où la bande a sa plus grande largeur est un peu plus sinuée que la première. Cette bande centrale contient des marbrures blanches, disséminées aux inférieures, accumulées aux supérieures entre la 2 et le bord interne; les premières ailes marbrées en outre de blanc à la côte, surtout vers la base ainsi qu'à l'angle interne et possédant un petit point apical blanc et quelques points subterminaux noirs; les inférieures également marbrées de blanc le long du bord abdominal et avec quelques points subterminaux noirs. Franges couleur du fond.

Dessous des quatre ailes brun jaunâtre, irrégulièrement strié d'écailles noires, les supérieures coupées par une ligne subterminale plus foncée, à peu près droite, partant de l'apex pour atteindre le bord interne vers le troisième quart, l'aile se fonçant légèrement extérieurement à cette ligne qui est accompagnée d'un trait blanc apical.

Tête, corps et pattes brun jaunâtre, les quatre premiers anneaux de l'abdomen se relevant sur le sommet en forme de petites crêtes et quelques points irréguliers blancs.

Rio Songo, Bolivie; un ♂.

Port d'*Acrotomodes hepaticata* Warr. décrit de Sao Paolo sur une ♀; en serait-ce le ♂?

Bapta pulverulenta n. sp. — 39 mill. — Supérieures avec l'apex pointu et le bord terminal arrondi. Dessus des quatre ailes blanc luisant régulièrement semé de petites stries opaques assez clairsemées qui se voient mieux sous un certain jour ou par transparence, sans aucun dessin, la côte des supérieures très finement jaunâtre. Dessous blanc luisant, les stries ne se voyant que par transparence. Franges blanches. Palpes, front et vertex jaunes; collier blanc avec quelques poils jaunes sur les côtés; ptérygodes, thorax et dessus de l'abdomen blancs; pattes blanches avec quelques poils jaunes.

Popayan, Colombie; une ♀.

Sangalopsis angulimacula n. sp. — 25 mill. — Dessus des supérieures noir brun avec une large tache rouge qui remplit toute la cellule (la côte restant noir brun), la dépasse un peu, se dirige droit vers l'angle interne, s'arrondit après la 2 pour s'arrêter sur la 1 d'où elle remonte, après un angle, à la cellule sur la naissance

de la 2. Dessus des inférieures noir brun uniforme. Franges noir brun. Dessous pareil, le fond noir brun moins uniformément sombre, les inférieures avec un trait cellulaire et une ligne extracellulaire arrondie qui, sans être dessinés, se laissent deviner. Palpes, tête, corps et pattes noir brun.

Bolivie ; un ♂.

Voisin de *Sangalopsis marginata* Warr. et assez semblable à *intermedia* Warr., mais la tache différente.

Dialephtis semimarginata n. sp. — 42 mill. — Les quatre ailes d'un beau jaune orange avec une large bordure terminale noire, plus large à l'apex des supérieures; la côte des premières ailes coupée de jaune orange au-dessus du milieu et largement bordée de noir dans sa première moitié. Dessous comme le dessus. Palpes jaunes, l'extrémité noire; front noir liséré de jaune; ptérygodes noires bordées de jaune en avant; abdomen noir avec trois bandes longitudinales jaunes, une dorsale et deux subdorsales; le dessous blanchâtre.

Colombie ; une ♀.

Ce papillon, très voisin de *Dialephtis Salvini* Feld. (pl. 105, fig. 14), en diffère non seulement par l'absence de toute bordure noire le long du bord interne des supérieures, mais encore par sa bande terminale des inférieures qui est beaucoup plus large; je ne crois pas que ce puisse en être la ♀.

Josia subcuneifera n. sp. — ♂ 30 ♀, 35 mill. — Ailes noires; les supérieures avec la bande longitudinale jaune orangé comme dans *ligula* Hb., mais plus large, renflée au milieu, finissant en pointe sans atteindre tout à fait le bord terminal; les inférieures avec la bande longitudinale également comme dans *ligula*, mais plus large et envahissant tout le bord abdominal jusqu'au delà de l'angle anal. Dessous comme le dessus, mais les bandes s'élargissant encore, arrivant bien au bord terminal, envahissant aux inférieures la côte sur les trois premiers quarts, bref ne laissant de noir sur ces dernières ailes qu'une bande subcostale et l'apex et une seconde petite bande avant la 2. Côte des supérieures entièrement noire dessus et dessous, alors que dans *ligula* cette côte est lisérée de jaune des deux côtés sur sa première moitié. Franges jaunes à l'angle anal des inférieures, puis entièrement noires. Front, intérieur des cuisses et dessous du corps blancs, vertex noir avec un point blanc à la base des antennes; collier noir en dessus avec deux bandes jaunes transversales sur les côtés, l'une des bandes se continuant sur les ptérygodes, l'autre sous l'aile, puis le long du corps en une bande longitudinale jaune, les côtés et le dessus de l'abdomen ainsi que le thorax noirs. Dans *ligula*, le front est jaune.

Environs de Loja, Équateur; une paire.

Cette espèce forme le passage entre *Josia ligula* Hb. et *fusifera* Wlk.

Odontoptila mimica n. sp. — 16 mill. — Dessus des supérieures blanc verdâtre avec le point cellulaire et trois lignes transversales brun olivâtre, savoir : une extrabasilaire arrondie, une extracellulaire également arrondie au centre de l'aile, infléchie intérieurement en dessous de la 2, puis droite jusqu'au bord interne, enfin une subterminale parallèle à la seconde ligne, s'épaississant et s'ombrant extérieurement de noir, d'abord entre la 2 et le bord interne, puis une seconde fois entre 4 et 6. Bord terminal coudé sur 3 et 4, la frange couleur du fond, coupée de noir sur 3 et 4. Dessus des inférieures verdâtre traversé par deux lignes ondulées (extrabasilaire et extracellulaire) faisant suite aux deux premières lignes des supérieures, le point cellulaire noir suivant de près l'extrabasilaire, la frange concolore. Dessous blanc sale aux inférieures, jaunâtre aux premières ailes, la première moitié des supérieures enfumée et sans ligne extrabasilaire, les quatre ailes avec deux lignes communes, nettes et plus larges que celles du dessus, la première assez régulièrement arrondie, contenant aux inférieures un très petit point cellulaire, la seconde sinueuse et envahissant la plus grande partie de l'espace subterminale; le bord terminal très finement liséré de brun.

Loja, Équateur; une ♀.

Ressemble superficiellement à *Craspedia ambagifera* Warr.

Semæopus? anomala n. sp. — 38 mill. — Dessus des quatre ailes gris testacé régulièrement semé de fines écailles rougeâtres; chaque aile avec un très petit point cellulaire brun rougeâtre aux supérieures, jaunâtre aux inférieures, et les lignes suivantes rougeâtres : une extrabasilaire un peu arrondie aux premières ailes et deux lignes communes, l'une extracellulaire, dentée, parallèle au bord terminal sur les supérieures, coupant le milieu de l'aile et se coudant autour du point cellulaire aux inférieures, la dernière subterminale, parallèle à celle-ci mais un peu plus tourmentée et semant sur son passage un gros point brun rougeâtre sur chaque nervure. Bord terminal des quatre ailes régulièrement festonné avec une touffe de poils brun rougeâtre à l'extrémité de chaque nervure, la frange couleur du fond. Dessous des supérieures testacé gris, des inférieures testacé blanchâtre, les premières ailes avec le point cellulaire et les deux dernières lignes épaissies et noirâtres, les secondes ailes avec la trace du point et de la subterminale; aux quatre ailes des points nervuraux noirs sur la subterminale, un fin liséré noir terminal et une touffe de poils noirs à l'extrémité de chaque nervure, la frange couleur du fond.

Palpes avec le devant testacé, les côtés bruns; front brun rougeâtre; vertex brun foncé; sommet de la tête testacé; collier, dessus et dessous du corps couleur du fond des ailes; antennes avec double ciliation comme dans le genre *Trygodes* Gn.

Popayan, Colombie; un ♂.

Cette espèce est, en plus grand, la reproduction presque exacte de *Semœopus?* (*Dysephyra*) *errabunda* mihi de Loja, Équateur; mais, dans *errabunda*, la ligne subterminale et les franges ne sont coupées d'aucun des points bruns si marqués dans *anomala*, et les points cellulaires sont plus gros et pupillés de blanc aux quatre ailes.

Anisodes marginepunctata n. sp. — 20 mill. — Dessus des quatre ailes gris testacé semé de quelques atomes rougeâtres, les supérieures avec la côte coupée assez régulièrement par cinq grosses taches d'un brun rougeâtre, le point cellulaire et deux séries de points nervuraux bruns, ceux-ci à l'emplacement de l'extrabasilaire et de la subterminale. Les inférieures avec un gros point cellulaire blanc pur auréolé de rougeâtre et les deux lignes de points nervuraux bruns faisant suite à celles des supérieures, chacune se terminant sur le bord abdominal par une grosse tache brune; bord terminal des quatre ailes avec une tache brun rougeâtre entre chaque nervure, l'extrémité des nervures avec une petite touffe de poils rougeâtres, la frange couleur du fond. Dessous des quatre ailes blanc jaunâtre luisant avec quelques vagues indications des dessins du dessus, les premières ailes teintées de rosé. Dessous et extrémité des palpes testacés, dessus rougeâtre; front testacé ombré de rougeâtre; ptérygodes et thorax testacés, bordés de rougeâtre en avant; abdomen et pattes testacés.

Loja, Équateur; un ♂.

Cette espèce est voisine d'*Anisodes lichenea* Warr. de la Jamaïque.

Cnemodes rubripuncta n. sp. — 26 mill. — Dessus des quatre ailes gris testacé régulièrement semé d'une infinité de petits atomes rougeâtres, les dessins rouge terreux pâle se composant de fines lignes bien nettes, disposés à peu près exactement comme dans *indignaria* Gn., savoir: une extrabasilaire, à peine arrondie, aux supérieures; une médiane commune contournant extérieurement de près le point cellulaire aux inférieures; enfin, une extracellulaire également commune, mais ondulée. Comme dans *indignaria*, les bords terminaux ont un fin liséré; chaque aile avec son point cellulaire rouge terreux pâle pupillé de blanc, les points des secondes ailes doubles de ceux des supérieures. Frange, tête et corps couleur du fond. Dessous plus pâle avec un vague rappel des dessins du dessus.

Tucuman; une ♀.

Ptychopoda cubitata n. sp. — 19 mill. — Dessus des quatre ailes luisant, jaune paille, les dessins rosé pâle. Les supérieures avec la côte rosée et cinq lignes transversales, savoir : une basilaire, une extrabasilaire, une médiane partant du bord interne et coupée à la 2, une extracellulaire et une subterminale allant de la 2 à la côte; la 2 longée par une ligne longitudinale également rosée, enfin, une ligne terminale partielle. Inférieures avec un point cellulaire, une ligne extracellulaire, une subterminale se coudant extérieurement sur la 4 pour y rejoindre un commencement de ligne terminale. Toutes ces lignes très larges et irrégulières. Franges paille coupées de quelques poils rosés. Dessous blanc paille luisant, partiellement rosé, surtout aux supérieures. Dessus du corps paille et rosé.

Micay, Colombie; un ♂.

Très voisin de *Ptychopoda quadrirubrata* Warr.

Calyptocome incarnata n. sp. — 16 mill. — Dessus des quatre ailes sans aucun dessin apparent, d'un carné jaunâtre semé de fines écailles rosées qui s'accumulent un peu en bordure; la frange concolore semée de poils rosés. Tête et dessus du corps également concolores et légèrement teintés de rosé. Dessous des ailes et du corps blanc jaunâtre.

La Uruca près San-José, Costa-Rica; une ♀.

Thamnonoma punctilineata n. sp. — 27 mill. — Dessus des quatre ailes gris crémeux semé de fins atomes bruns, les supérieures et la partie médiane du bord abdominal légèrement teintées de rosé, les dessins bruns. Ils se composent aux supérieures de quatre lignes : une extrabasilaire à peine arrondie, une antémédiane oblique, droite, plus éloignée de la base à la côte qu'au bord interne, une extracellulaire légèrement coudée au départ de la côte, enfin une subterminale légèrement infléchie et aboutissant à l'apex; les trois premières lignes semant sur leur passage des points nervuraux bruns, la subterminale plus fortement dessinée; bord terminal avec un point brun entre chaque nervure; un point cellulaire entre la seconde et la troisième ligne. Inférieures avec trois lignes droites transversales sans points nervuraux et qui ne sont bien indiquées qu'au départ du bord abdominal; ces trois lignes sont à peu près régulièrement espacées et coupent l'aile en quatre parties à peu près égales; un point cellulaire à peine perceptible entre la première et la seconde ligne; bord terminal avec une série de points internervuraux comme aux supérieures; franges couleur du fond. Dessous des quatre ailes comme le dessus, mais d'une teinte plus chaude, semé d'atomes plus gros, les points cellulaires bien nets et les lignes bien indiquées et s'élargissant, la médiane des inférieures

faisant un coude après le point, l'extrabasilaire des supérieures disparaissant complètement; les points terminaux comme en dessus. Tête et corps couleur du fond, une série dorsale de points bruns sur l'abdomen.

Lojà, Équateur; un ♂.

Perigramma marginata n. sp. — 43 mill. — Port de *Genussa celerenaria* Wlk. auquel cette espèce ressemble exactement, sauf la bande noire transversale des supérieures, absente dans *marginata*. Les quatre ailes blanches; les supérieures avec la côte, le bord terminal et le bord interne lisérés de gris cendré, plus largement à l'apex; les inférieures avec une bordure terminale semblable, Franges blanches. Dessous semblable. Corps blanc; pattes blanches, les extrémités gris cendré.

San-Ernesto, Mapiri, Bolivie ; un ♂ pris à 1,000 mètres d'altitude pendant la saison sèche.

Nipteria ellopiata n. sp. — 36 mill. — Dessus des ailes gris cendré; les supérieures traversées par deux lignes brunes au premier et au second tiers de l'aile, la première ligne légèrement arrondie et coudée à la côte, la seconde droite, oblique, à peu près parallèle au bord terminal. Les espaces basilaire et médian plus foncés, surtout sous un certain jour; un petit trait cellulaire. Inférieures avec un point cellulaire peu distinct et une ligne brune transversale, droite, au second tiers; l'intérieur de l'aile se fonçant comme aux supérieures. Franges concolores. Dessous gris cendré uniforme, les dessins du dessus indiqués en transparence. Tête, corps et pattes gris cendré.

Loja, Équateur ; un ♂.

Ne ressemble de près à aucune *Nipteria* que je connaisse.

Nipteria differens n. sp. — 29 mill. — Bord terminal des supérieures légèrement coudé sur la 4; les quatre ailes semi-transparentes, cendré pâle, la côte et les bords terminaux un peu plus opaques, avec un petit point cellulaire et, au second tiers, une ligne arrondie, coudée à la côte des supérieures, ligne et points qui, d'ailleurs, ne se voient que dans la transparence de l'aile. Les supérieures semblent de plus posséder une ligne extrabasilaire et une seconde antémédiane. Dessous semblable. Franges, tête, corps et pattes concolores.

San-Francisco près Loja, Équateur; un ♂.

Parallage intricata n. sp. — 34 mill. — Dessus des supérieures gris blond entièrement couvert de lignes et points noir brun; les lignes transversales sont une basilaire et une extrabasilaire peu nettes, une antémédiane sinuée, une médiane extrêmement

tourmentée en zigzag, une extracellulaire pâle, droite, et une subterminale bien dessinée, parallèle au bord. Un trait cellulaire épais, une grosse tache terminale entre 3 et 4; le long de la côte, les lignes s'épaississent et les nervures s'assombrissent; entre 6 et 7 le fond reparaît en une tache claire subcostale rappelant la tache de certaines *Nephodias*. Franges gris brun. Dessus des secondes ailes gris cendré pâle brillant avec un gros point cellulaire pâle suivi d'une ligne brune, diffuse, arrondie à la hauteur du point et l'indication d'une vague subterminale; les franges concolores. Les quatre ailes finement lisérées de brun. Dessous comme le dessus, mais plus sombre, le fond brunissant un peu et certaines lignes se fonçant également. Tête et corps gris cendré.

Popayan, Colombie; un ♂.

Ochyria tricolorata n. sp. — 31 mill. — Dessus des supérieures vert mousse, traversé par une large bande médiane marron, la côte coupée de nombreux traits noirs dont trois amorçant la ligne basilaire, d'ailleurs mal dessinée, et six amorçant la bande médiane; celle-ci est doublement plus large à la côte qu'au bord interne, parcourue en partie par six lignes, estompée de noir et de vert mousse, très sinuée sur les deux bords dont l'extérieur est bien denté sur 4 et 7. Espace subterminal vers l'angle interne d'un carné pâle; quatre points subterminaux blancs entre les nervures de 4 à 8 précédés intérieurement d'une petite bande marron. Franges couleur du fond. Dessus des inférieures blanc grisâtre luisant, la frange un peu crémeuse. Dessous des premières ailes noir, l'espace interne pâle; une bande extracellulaire blanche part sous la côte de la 8, atteint la 3 et remplit l'espace terminal entre 3 et 4; trois des points blancs subterminaux reparaissent entre les nervures 5 à 8. Apex pâle; franges noires coupées de blanc. Inférieures grisâtres avec l'indication d'un point cellulaire suivi de deux lignes transversales arrondies et d'une ombre terminale noire. Front et thorax jaunâtres; collier, ptérygodes et dessus de l'abdomen vert mousse.

Loja, Équateur; un ♂.

Epirrhoe respondens n. sp. — 25 mill. — Dessus des supérieures vert pâle, la côte coupée de nombreux traits noirs, avec deux lignes transversales : une antémédiane, un peu arrondie et une extracellulaire dentée sur 4 et 6, ces deux lignes plus écartées à la côte qu'au bord interne, l'espace entre elles se fonçant et formant une large bande médiane coupant l'aile en trois parties à peu près égales; une petite éclaircie un peu fauve après cette bande vers 5 et 6; une série subterminale de traits blancs, entourés pour la plupart de noir entre les nervures; la frange jaunâtre coupée de noir. Dessus des inférieures et franges d'un blanc jaunâtre très pâle

avec quelques fines marbrures noires vers l'angle anal. Dessous des supérieures enfumé, la partie apicale largement noire et cerclée de jaunâtre, l'apex lui-même jaunâtre; trois fines petites lignes costales précédant cet espace; dessous des inférieures jaunâtre strié de noir avec trois fines lignes transversales noires arrondies s'arrêtant avant le bord abdominal et une large ombre terminale noire coupée de jaunâtre. Franges jaunâtres.

Loja, Équateur; un ♂.

Cette espèce ressemble beaucoup à *Cidaria Yerba* Schs.

Coenocalpe marmorata n. sp. — 23 mill. — Dessus des ailes testacé marbré de blanc et de noir, les dessins brun fauve; ils se composent, aux supérieures, de trois lignes : une extrabasilaire sinuée, une antémédiane formant un coude anguleux dans la cellule et une extracellulaire oblique, parallèle au bord terminal, assez droite et marquée de points nervuraux, l'espace médian entre ces deux lignes contenant un trait cellulaire et se fonçant en fauve; une ligne subterminale blanche indécise. Inférieures avec un très petit point cellulaire et une série de lignes transversales qui ne sont bien indiquées que le long du bord abdominal, une subterminale blanche comme aux premières ailes. Franges testacées. Les quatre ailes avec le dessous luisant, d'un testacé grisâtre, quelques traces des lignes transversales du dessus et un point cellulaire beaucoup plus gros aux supérieures dont la côte est coupée de noir. Front brun, collier jaunâtre bordé de brun, ptérygodes brunes en avant, puis blanches, dessus du corps testacé.

Loja, Équateur; un ♂.

Tephroclystia rufipalpata n. sp. — 20 mill. — Dessus des quatre ailes blanc, les supérieures avec la côte fortement coupée de noir gris, un gros point cellulaire noir, une série de fines lignes noir gris transversales, parallèles, une large bande subterminale rousse, enfin une bordure terminale gris roux; inférieures traversées par une foule de fines lignes grises parallèles, les franges blanches coupées de gris. Dessous grisâtre, les supérieures avec un gros point cellulaire, plusieurs lignes transversales sombres arrondies et une subterminale blanche; les inférieures avec un petit point cellulaire et les lignes transversales arrondies comme aux premières ailes. Front, vertex et ptérygodes blancs; palpes allongés, roux.

Popayan, Colombie; une ♀.

Cymatophora? subatrata n. sp. — 36 mill. — Dessus des ailes testacé sombre avec un reflet mousse et de nombreuses petites stries brunes, les dessins bruns. Ils se composent aux supérieures

de quatre lignes dont les trois premières (l'extrabasilaire, l'antémédiane et l'extracellulaire) incomplètes et saccadées, la quatrième (la subterminale) formée d'une série de points intranervuraux et accompagnée d'une fine ligne blanche; une ombre extracellulaire brune sur la 4, suivie d'une ombre terminale entre 4 et 6; un petit point cellulaire. Les inférieures avec une ombre diffuse droite antémédiale suivie du point cellulaire, d'une fine ligne extracellulaire saccadée, enfin d'une fine subterminale blanche accompagnant les points intranervuraux comme aux premières ailes. Bords terminaux des quatre ailes avec des points ou taches brunes intranervurales; franges concolores. Dessous des quatre ailes testacé pâle, peu strié aux supérieures, uni et plus pâle encore aux inférieures; chaque aile avec un petit point cellulaire, les supérieures possédant une ombre subterminale brune complète, les inférieures n'en ayant qu'une amorce à la côte; points terminaux aux premières ailes. Tête et dessus du corps couleur du fond.

Santa-Cruz, Brésil méridional; un ♂ sans fovea.

Cymatophora? regularis n. sp. — ♂ 38, ♀ 41 mill. — Dessus des quatre ailes testacé fauve uniformément strié de brun, avec le point cellulaire peu net et une ligne commune, extracellulaire, bien arrondie, chevronnée, les pointes tournées extérieurement et formant point sur chaque nervure, une ligne médiane très irrégulière, complète aux deux ailes chez la ♀ où elle passe intérieurement au point dans les inférieures, à peine indiquée sur les premières ailes du ♂, rejoignant l'extracellulaire au bord interne des supérieures, une extrabasilaire peu sinuée et qui ne se voit qu'aux supérieures, enfin l'indication très vague d'une subterminale blanche. Bords terminaux festonnés avec une série de points terminaux très pâles entre les nervures; franges couleur du fond. Dessous luisant, uni, testacé pâle avec quelques traces des dessins du dessus se voyant par transparence. Antennes pectinées à lames courtes, mais égales dans les deux sexes; ♂ sans fovea, tête et corps couleur du fond.

Ville de San-Salvador; une paire.

Cymatophora? granillosa n. sp. — 41 mill. — Dessus des ailes cendré; les supérieures avec la côte coupée de noir aux amorces des lignes qui sont : une extrabasilaire et une antémédiane indiquées seulement par des points nervuraux, une extracellulaire géminée faisant un coude rentrant intérieurement entre 1 et 2, puis peu arrondie et marquée également de points nervuraux, une subterminale blanche chevronnée, précédée et suivie de traits noirs entre 4 et 6 et avec quelques chevrons noirs intérieurs; un point cellulaire noir et une série de gros points terminaux noirs entre les

nervures. Inférieures traversées par une antémédiane, une extracellulaire géminée faisant un coude rentrant intérieurement entre 1 et 2, puis bien arrondie et formant comme un W incomplet, la pointe extérieure des deux demi-cercles sur la 1 et la 4, la ligne subterminale blanche chevronnée précédée de quelques chevrons noirs et la série de points terminaux noirs intranervuraux comme aux premières ailes. Franges concolores. Dessous des supérieures grisâtre avec un point cellulaire bien marqué, l'apex blanc entouré d'une large ombre noire qui se continue le long du bord terminal; dessous des inférieures blanchâtre avec le point cellulaire; les quatre ailes avec les points terminaux noirs entre chaque nervure comme en dessus. Tête, corps et pattes cendrés.

Tucuman; deux ♀ dont l'une plus grise que l'autre.

La forme zigzaguée de la ligne extracellulaire géminée des inférieures semble bien caractéristique dans cette espèce.